

Unipramida[®] Inyectable

Antiemético

Uso en Caninos y Felinos

Unipramida inyectable es un antiemético y digestivo de elección porque la Metoclopramida posee actividad anti dopaminérgica. Deprime la zona de quimiorreceptores, pero también fomenta la liberación y aumenta la sensibilidad del músculo liso visceral a la acetilcolina. Los mecanismos de control central también pueden estar implicados en su acción. Los efectos farmacodinámicos de la Metoclopramida incluyen el aumento del tono del esfínter esofágico inferior aumentando en la fuerza y frecuencia de las contracciones gástricas, facilitando el vaciado gástrico con coordinación mayor de la relajación pilórica y motilidad duodenal y disminución del tiempo de tránsito en el intestino delgado proximal. La metoclopramida actúa en el tracto digestivo y en el S N C. En el tracto digestivo superior la metoclopramida incrementa la liberación de la acetilcolina de las neuronas y la sensibilidad de los receptores colinérgicos a la acetilcolina. Muchas alteraciones de la actividad gastrointestinal se deben a un trastorno de la estimulación colinérgica, lo que explica porque la metoclopramida es la más eficaz en enfermedades con motilidad reducida o alterada. La metoclopramida es antagonista de la dopamina lo cual es beneficioso en el tracto gastrointestinal en el que la dopamina inhibe la motilidad. La metoclopramida atraviesa fácilmente la barrera hematoencefálica donde el antagonismo con la dopamina en el área de la estimulación de quimiorreceptores produce un efecto antiemético.



FORMULA

Cada 100 ml contiene:

Metoclopramida clorhidrato500 mg

INDICACIONES

Antiemético, para tratamiento sintomático de enfermedades que cursen con vómitos, estados nauseosos. Reflujo esofágico, gastritis, gastritis crónica asociada al vaciamiento gástrico retardado, parálisis gástrica, cirugía de dilatación gástrica, cirugía del vólvulo o del píloro y el íleo intestinal postquirúrgico.

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Caninos y Felinos

1 ml/ 10 Kg de peso vivo cada 6 u 8 horas por vía SC, IM,IV suministrado lentamente.

1 ml /2.5 a 5 Kg de peso vivo equivalente a, 1 a 2 mg /Kg de peso vivo en infusión continua.

Hasta remisión de síntomas.

CONTRAINDICACIONES

Los efectos secundarios incluyen nerviosismo, inquietud apatía y depresión. También es bastante común observar estreñimiento con el uso prolongado.

La metoclopramida esta contraindicada en caso de obstrucción o perforación intestinal , en epilepsia y en animales tratados con neurolépticos.

La atropina y los analgésicos opiáceos antagonizan su acción.

En el cuerpo estriado el antagonismo con la dopamina induce efectos graves en general llamados signos extrapiramidales (espasmos musculares, agitación motora). La acción procinética de la metoclopramida se bloquea con fármacos analgésicos narcóticos o anticolinérgicos.

PRESENTACIÓN:

Frasco vidrio 50 ml

INDICACIONES DE ALMACENAMIENTO

Mantener por debajo de 30°. Uruguay no almacenar a temperaturas superiores a 25°.

Conservar en un lugar fresco, seco y protegido de la luz solar.

Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Eliminar el envase en el centro de acopio más cercano