

# Diurovet<sup>®</sup>

## Uso en caninos.

**Potente diurético** de Asa inhibe reabsorción de sodio y cloro en asa proximal, aproximadamente 10 veces más potente, con acción diurética más prolongada y mayor ahorro de potasio que la furosemida.

## FÓRMULA

Cada comprimido contiene

Torase mide ..... 6 mg  
Excipientes csp ..... 250 mg

## INDICACIONES:

Diurético.

Tratamiento de los edemas asociados con la insuficiencia cardiaca congestiva, congestión pulmonar, ascitis enfermedad renal o hepática y acumulación de líquidos de origen no inflamatorio.

Indicado para el tratamiento de las anomalías en el volumen de líquido y la composición de electrolitos. Reducción de edemas periféricos o pulmonares causados por enfermedades cardíacas, vasculares o renales.

## DOSIFICACIÓN

La dosis recomendada de torase mide es de 0,1 a 0,6 mg por kg de peso, **una vez al día**.

La mayoría de los casos son estabilizados a una dosis de toresamide menor o igual a 0,3 mg por kg de peso, una vez al día. Es decir **1 comprimido cada 20 kg por día**.

Comprimidos uniformes, pueden administrarse fracciones según el peso del animal.

La dosis debe ajustarse para mantener la comodidad del perro con atención al estado de la función renal y al nivel de electrolitos. Si el nivel de diuresis requiere modificarse, la dosis puede ser incrementada o disminuida, dentro del rango de dosis, en incrementos de 0,1 mg/kg de peso.

Una vez que los signos de insuficiencia cardíaca congestiva han sido controlados y el perro está estable, si se requiere un tratamiento diurético a largo plazo con este medicamento, se debe continuar con la dosis efectiva más baja.

Un examen frecuente del animal facilitará el establecimiento de una dosis de diurético apropiada. La pauta de administración diaria puede ser programada, para controlar el período de la micción según necesidad. Dosis orientativas.

Se debe seguir el criterio del Médico Veterinario actuante.



## VENTAJAS

- ✓ Una vez al día.
- ✓ Fácil de usar
- ✓ 10 veces más potente que furosemide
- ✓ Mayor ahorro de potasio
- ✓ Puede administrarse a independencia de las comidas
- ✓ No se convierte en refractario
- ✓ Valor del tratamiento conveniente

## RECOMENDACIÓN

Los pacientes deben beber adecuadas cantidades de agua para evitar una deshidratación marcada. Las dosis y advertencias sugeridas en todos los casos quedan a consideración del médico veterinario actuante.

## CONTRAINDICACIONES

No usar en casos de anuria, deshidratación severa, hipovolemia, hipersensibilidad a la torasemide o a alguno de los excipientes. No usar concomitantemente con otros diuréticos de asa. No se recomienda uso en hembras preñadas y en lactación.

Contactar al veterinario si se presentan signos clínicos de desequilibrio hidroelectrolítico, manifestaciones tales como excesiva sed, letargia, inquietud, aumento de la micción, alteración gastrointestinal y rápida frecuencia cardíaca.

## PRESENTACIÓN

Caja con blister conteniendo 10 comprimidos.