

Guardian® Libre de pulgas, garrapatas y sarna

112.5/250/500/1000



Comprimidos palatables
Uso veterinario.

Antiparasitario externo en comprimidos palatables de uso oral para caninos. Indicado para el tratamiento en perros con infestaciones por **pulgas, garrapatas y ácaros de la sarna doméstica, sarcóptica y otodéctica.**

Efecto por **hasta 12 semanas.**

INDICACIONES DE USO

Guardian está indicado para su uso en caninos.

Para perros adultos y cachorros mayores de 8 semanas de edad que pesen más de 2 kg.

Está indicado para el control de infestaciones de pulgas (*Ctenocephalides felis* y *Ctenocephalides canis*) y garrapatas (*Ixodes* spp., *Rhipicephalus sanguineus* adultas y jóvenes con acción inmediata, *Amblyomma* spp.). Indicado para el control de pulgas en caso de dermatitis alérgica causada por las picaduras de pulgas.

También está indicado para el tratamiento de la sarna demodéctica causada por *Demodex* sp., la sarna sarcóptica causada por *Sarcoptes scabiei* y la sarna otodéctica (auricular) causada por *Otodectes* spp.

Además de ser eficaz para causar la muerte de los parásitos externos posterior al tratamiento, este compuesto puede reducir la posibilidad de transmisión de patógenos, como es el caso del cestodo *Dipylidium caninum* desde pulgas infestadas a perros susceptibles. Garrapatas (*Ixodes* spp. y *Rhipicephalus sanguineus* adultas y jóvenes, *Amblyomma* spp.). Pulgas (*Ctenocephalides felis* y *Ctenocephalides canis*) y ácaros (*Demodex* sp., *Sarcoptes scabiei* y *Otodectes cynotis*).

FÓRMULA

Cada g contiene:

Fluralaner 333,3 mg

Excipientes c.s.p. 1 g

DOSIFICACIÓN

La dosis es de 25–56 mg de fluralaner/kg de peso, dentro de una franja de peso. De acuerdo al peso del animal, administrar el comprimido adecuado según la siguiente tabla.

En caso de que el peso del perro sea superior a 40 kg, aplicar una combinación de dos o más comprimidos que se ajuste al peso corporal.

No fraccionar el comprimido.

Debe suministrarse con la comida.

PESO DEL PERRO	FLURALANER POR COMPRIMIDO	PRESENTACIÓN
MUY PEQUEÑOS (2 - 4,5 kg)	112.5 mg	Guardian 112.5
PEQUEÑOS (4,6 - 10 kg)	250 mg	Guardian 250
MEDIAÑOS (10,1 - 20 kg)	500 mg	Guardian 500
GRANDES (20,1 - 40 kg)	1000 mg	Guardian 1000
MUY GRANDES (>40 kg)	UTILIZAR COMBINACIONES SEGÚN EL PESO	

Para la infestación de pulgas, la administración es en intervalos de 12 semanas. El efecto para pulgas se puede observar luego de 8 horas de que la pulga se haya alimentado, y para garrapatas, luego de 12 horas de que la garrapata se haya alimentado.

Para el tratamiento de la sarna demodéica causada por *Demodex sp.*, se debe de administrar una dosis única. En estos casos, se debe tener en cuenta que la sarna demodéica es una enfermedad multifactorial, por lo que se recomienda tratar cualquier enfermedad subyacente.

Para el tratamiento de la sarna sarcóptica causada por *Sarcoptes scabiei* y la sarna otodéica (auricular) causada por *Otodectes spp.*, debe administrarse en una única dosis. Para el tratamiento de infestación por garrapatas (*Ixodes spp.* y *Rhipicephalus sanguineus* adultas y jóvenes, *Amblyomma spp.*), se ha demostrado eficacia en un intervalo entre dosis de 4 semanas. Seguir las indicaciones del médico veterinario tratante.

MECANISMO DE ACCIÓN

Fluralaner es un acaricida/insecticida que inhibe el receptor ácido gamma-aminobutírico (GABA) y los canales de cloruro activados por glutamato, con una selectividad significativa para las neuronas de insectos sobre las neuronas de mamíferos. Esto trae como consecuencia la inducción de una actividad neuronal descontrolada, con la consiguiente parálisis y muerte de las pulgas y garrapatas.

CONTRAINDICACIONES Y EFECTOS ADVERSOS

Se pueden presentar como efectos adversos problemas gastrointestinales tales como disminución del apetito, vómitos y diarrea.

Otros efectos adversos han sido hipersalivación, incoordinación o convulsiones. No administrar en animales que presenten hipersensibilidad al principio activo. Administrar con precaución en animales con antecedentes de convulsiones o epilepsia.

PRECAUCIONES

No suministrar en cachorros menores a 8 semanas y/o que pesen menos de 2 kg. No fraccionar el comprimido.

Observar al animal mientras se administra el producto para comprobar que lo ingiera correctamente.

No comer, beber o fumar mientras se manipula el medicamento veterinario. Lavarse las manos cuidadosamente con agua y jabón inmediatamente después de utilizar el medicamento.

ALMACENAMIENTO

Mantener siempre en su envase original. Conservar en un lugar fresco, seco y protegido de la luz solar directa. No almacenar por encima de 30 °C. Conservar fuera del alcance de los niños y animales domésticos. Eliminar en el centro de acopio más cercano.

UNIMEDICAL Div. Veterinaria

Industria Uruguaya - Unimedical del Uruguay Ltda.
 Paysandú 986 - Tel.:(+598) 2900 0090 - C.P.: 11100
 Montevideo, Uruguay / Establecimiento Elaborador N° 81
 Dir.Téc.Dra. Mercedes Etcheverry